FRONTLINE

SPOT ON

CONTROINDICAZIONI:

- In mancanza di dati, non utilizzare il prodotto nei cuccioli di età inferiore alle 8 settimane.
- Non utilizzare in animali malati (malattie sistemiche, con febbre,...) o convalescenti.
- Non usare nei conigli poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ai cani. Non utilizzare nei gatti, per evitare fenomeni di sovradosaggio.
- Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

4 pipette da 1,34 ml

INDICAZIONI DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo:

Fipronil _____ 10 g

ECCIPIENTI

Butilidrossianisolo _____ 0,02 g Butilidrossitoluene _____ 0,01 g

Eccipienti _____ q.b.a 100 ml

FORMA FARMACEUTICA: Soluzione per uso esterno

SPECIE DI DESTINAZIONE:

 Cani

INDICAZIONI: Trattamento e prevenzione delle infestazioni da zecche (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp), da pulci (*Ctenocephalides* spp) e da pidocchi nei cani adulti e nei cuccioli.

- Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle zecche, impedendo lo sviluppo del parassita e l'eventuale trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. E' attivo contro le principali specie di zecche presenti sul territorio nazionale, tra cui *Ixodes ricinus*, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all'uomo
- Il fipronil agisce sulle pulci uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni. Grazie all'azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce e cacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane, è provocata dall'azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti
- Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da pidocchi, in particolare quelle provocate da *Trichodectes canis*, pidocchio masticatore del cane. Il fipronil elimina le pulci entro 24 ore; le zecche e i pidocchi entro 48 ore dall'infestazione.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

POSOLOGIA: Una pipetta monodose da 1,34 ml per cani di peso da 10 a 20 kg, corrispondente alla dose minima raccomandata pari a 6,7 mg/kg di fipronil. Un'unica applicazione del prodotto protegge l'animale da nuove infestazioni da zecche, da pulci e da pidocchi, in particolare:

- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento.
- da pulci: fino a 3 mesi dopo il trattamento.

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile e attuare trattamenti mensili nei periodi di maggiore stagionalità.

VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Uso esterno: per applicazione cutanea diretta.

MODALITÀ D'USO: • Rompere l'estremità pre-tagliata della pipetta

- Applicare il prodotto sulla cute dell'area interscapolare, zona in cui il cane non arriva a leccarsi, evitando l'asportazione del prodotto
- Il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo: premere sulle pareti della pipetta, fino a completo svuotamento (come da illustrazioni esplicative)
- Il fipronil di onde nell'epidermide, concentrandosi nelle ghiandole sebacee dei follicoli piliferi, nelle 24 ore successive all'applicazione
- FRONTLINE SPOT ON CANI può essere utilizzato durante la gravidanza e nel periodo dell'allattamento
- I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata d'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

AVVERTENZE SPECIALI: E' importante che il prodotto sia applicato in una zona in cui l'animale non riesca a leccarsi e fare attenzione a che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento. Evitare il contatto con gli occhi dell'animale. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Non applicare il prodotto su ferite o cute lesa.

PRECAUZIONI: Si consiglia di evitare immersioni in acqua o bagni nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto e bagni con una frequenza superiore ad una volta alla settimana, poiché non ci sono dati disponibili a dimostrazione di quanto questo interferisca sull'attività del prodotto. Si possono utilizzare shampoo emollienti prima del trattamento, ma, se utilizzati settimanalmente dopo l'applicazione del prodotto, riducono la durata della protezione nei confronti delle pulci a circa 5 settimane. Bagni settimanali con shampoo medicati al 2% di clorexidina non hanno ridotto l'efficacia del prodotto nei confronti delle pulci nel corso di uno studio della durata di 6 settimane.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto. Qualora il cane sia stato trattato prima dell'esposizione alle zecche, queste saranno eliminate nelle prime 24-48 ore dopo l'attacco, ovvero prima del completamento del pasto, riducendo ma non escludendo il rischio di trasmissione di malattie. Una volta morte, le zecche cadranno dagli animali, eventuali zecche rimanenti potranno essere facilmente rimosse tirandole leggermente.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cuccia dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio trattamento antiparassitario, possono essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore. Per un controllo ottimale delle infestazioni da pulci è consigliabile trattare tutti gli animali conviventi.

REAZIONI AVVERSE

Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.

Tra gli estremamenti rari fenomeni di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee al sito di applicazione (decolorazione della cute, alopecia locale, prurito, eritema) e prurito di uso o alopecia dopo applicazione.

Eccezionalmente sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), vomito o sintomatologia respiratoria.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questa etichetta esterna/foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SOVRADOSAGGIO

Negli studi di innocuità non sono stati osservati effetti collaterali nei cuccioli di 8 settimane di età, nei cani in accrescimento e nei cani con peso di circa 2 kg, trattati una volta a dosi cinque volte superiori alla dose raccomandata. Il rischio dell'insorgenza di reazioni avverse (vedi paragrafo Reazioni avverse) può comunque aumentare in caso di sovradosaggio, quindi gli animali dovrebbero sempre essere trattati con la pipetta della dimensione corrispondente al relativo peso corporeo.

Non superare la dose consigliata.

PRECAUZIONI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA PERSONA CHE SOMMINISTRA IL PRODOTTO AGLI ANIMALI

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Se l'irritazione oculare persiste consultare un medico e mostrargli l'etichetta.

Evitare il contatto con FRONTLINE SPOT ON CANI agli animali o alle persone con sensibilità accertata nei confronti di insetticidi o alcool. Evitare che il contenuto entri in contatto con le mani. In tal caso, lavarsi le mani con acqua e sapone.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia quindi di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini. Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto a temperature non superiori a 30°C.

TITOLARE A.I.C.

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

Via Lorenzini 8 - 20139 Milano

RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet - 31000, Tolosa (Francia)

A.I.C. N° 103030058 del Ministero della Salute

SOLO PER USO VETERINARIO.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE

E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

Tutti i medicinali veterinari o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.