

**TEMPO DI ATTESA:** Non pertinente.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.  
Conservare nella confezione originale in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Proteggere dalla luce solare diretta.

Dopo apertura, usare entro 6 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI:**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

**SOLO PER USO VETERINARIO - VENDITA NON SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI**

Gruppo farmaco terapeutico: Antelmintici-Imidazotiazoli.

Codice ATC: QP52AE02

**NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922

e-mail: vetline@formevet.it

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: CHEMIFARMA S.p.A.

Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì - Italia

A.I.C. n. 103451011

H/0213



A103451011



# TETRAMISOLE 10%

## FORMEVET, 100 mg/g

Polvere idrosolubile per soluzione orale, da sciogliere in acqua da bere.

Per uccelli da gabbia e da voliera.

Tetramisolo

BUSTA DA **30 g**



**INDICAZIONE DEI PRINCIPII ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE:** 1 g di prodotto contiene: *principi attivi:* tetramisolo 100 mg.

**INDICAZIONI:** Per uccelli da gabbia e da voliera. Terapia delle Ascariidiosi, Capillariosi, Ossiuiriasi.

**MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:** Da 2,50 g a 6 g per ogni litro di acqua da bere, a giudizio del medico veterinario. Durata del trattamento: 1-2 giorni.

Si raccomanda di sciogliere il prodotto nell'acqua da bere al momento dell'uso e con la massima cura. Si raccomanda di sostituire ogni giorno l'acqua da bere.

**POSOLOGIA:**

**AVVERTENZE SPECIALI: Precauzioni speciali per l'impiego:** Si deve aver cura di evitare le seguenti pratiche perché aumentano il rischio di sviluppare resistenza e possono portare infine ad inefficacia terapeutica: • Uso troppo frequente di antelmintici appartenenti alla stessa classe, per un periodo prolungato di tempo. • Ipodosaggio dovuto ad errata stima del peso corporeo, somministrazione sbagliata del prodotto. I casi clinici sospettati di resistenza agli antelmintici devono essere ulteriormente analizzati usando test adatti. Laddove i risultati dei test rivelano chiaramente resistenza ad un particolare antelmintico, si deve impiegare un antelmintico appartenente ad un'altra classe farmacologica ed avente un diverso meccanismo d'azione.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:** Si raccomanda di miscelare il prodotto nell'acqua da bere al momento dell'uso e con la massima cura. Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate.

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:** Manipolare con cura, lavare le mani dopo l'uso. In caso di malesere o ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli l'etichetta. Le persone con nota ipersensibilità al tetramisolo e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

**Impiego durante l'ovodeposizione:** Durante il periodo riproduttivo e durante l'ovodeposizione usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:** Dati non disponibili.

**Sovradosaggio:** Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate.

**Incompatibilità:** In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

**Controindicazioni:** Non usare in caso di ipersensibilità al tetramisolo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

**Reazioni avverse:** Molto rare. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi non menzionate in questa etichetta/foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.



8 033638 270202